Exercice du test de dépistage

Le Chikungunya est une maladie virale transmise d'un être humain à l'autre par les piqûres de moustiques femelles infectées. Un test salivaire a été mis au point pour son dépistage. Une étude est menée sur 2000 personnes pour vérifier l'efficacité de ce test. On a observé que :

- 15 % des personnes testées sont effectivement atteintes par le virus
- 2% des personnes atteintes par le virus ont eu un test négatif
- 1% des personnes non atteintes par le virus ont eu un test positif



On parle de « faux négatif » lorsqu'une personne atteinte par le virus a un test négatif et de « faux positif » lorsqu'une personne non atteinte par le virus a un test positif. Pour que ce test soit considéré comme efficace, on souhaite que :

- a) La part de faux négatifs parmi les tests négatifs soit inférieure à 1 %
- b) La part de faux positifs parmi les tests positifs soit inférieure à 5 %

Le test remplit-il ces deux critères d'efficacité?


Attention, lorsqu'on travaille avec des pourcentages, on doit faire très attention à ce qui vient après le signe « % ».

<u>Exemple</u>: « 2 % **des personnes atteintes par le virus** ont eu un test négatif. » Cela veut dire que les faux négatifs représentent 2 % <u>parmi l'ensemble des personnes malades</u>. On ne peut donc pas conclure que le premier critère n'est pas rempli. En effet, c'est la proportion de faux négatifs <u>parmi l'ensemble des tests négatifs</u> qui doit être inférieure à 1 % !

Pour calculer cette proportion, on peut s'aider en remplissant un tableau croisé d'effectifs.

	Test positif		Test négatif	Total
Malades	294		6 B	300 A
Pas malades	17 (9	1603	1700
Total	311		19689	2000

Remarque : La colonne et la ligne nommées «Total» sont appelées les marges du tableau



Conclusion: seul le critère a) est merifié

→ Tableau des fréquences marginales

On divise chaque case du tableau d'effectif par l'effectif total. Les fréquences ainsi obtenues dans les marges du tableau sont appelées <u>fréquences marginales</u>.

	Test positif	Test négatif	Total
Malades	0,147	0,003	0,450
Pas malades	0,009	0,841	0,350
Total	0,156	0,845	1,000

Exemple : Interpréter la valeur de la case grisée.

14,7%) des personnes tectées sont malades et ont un test positif.

→ Tableau des fréquences conditionnelles en lignes

On divise l'effectif de chaque case par l'effectif total de la ligne correspondante. On parle de <u>fréquence</u> <u>conditionnelle</u> car l'ensemble de référence pour le calcul des fréquences n'est plus celui de la population totale : ce sera successivement l'ensemble des malades puis celui des non malades.

	Test positif	Test négatif	Total
Malades	0,98	0,02	1,00
Pas malades	0,01	0,99	1,00

Exemple : Interpréter la valeur de la case grisée.

2%. des personnes malades on un test megatif

→ Tableau des fréquences conditionnelles en colonnes

On divise l'effectif de chaque case par l'effectif total de la colonne correspondante. L'ensemble de référence pour le calcul des fréquences sera successivement l'ensemble des tests positifs puis celui des tests négatifs.

	Test positif	Test négatif
Malades	0,945	०,००५
Pas malades	0,055	0,996
Total	1,000	1,000

Exemple : Interpréter la valeur de la case grisée.

(0,4) & des personnes wec un test nécatif sant malade

Fanction 1: ModePiser des évolutions continues


> 25 20


Exercice des températures

Un site de météo fournit une courbe des températures à Dijon pour la journée du 9 octobre 2023.

On considère la fonction qui associe à l'heure de la journée la température mesurée en degré Celsius.


On note cette fonction $f: H \mapsto T$ où H est l'heure et T la température.






Heure

- 2. Quelle est l'ordonnée du point d'abscisse 4 de la courbe ? Que cela signifie-t-il pour la fonction f ?
- 3. Quelles sont les abscisses des points d'ordonnée 17 de la courbe ? Que cela signifie-t-il pour la fonction f ?
- **4.** Dressez le tableau de variations de la fonction f.
- 5. À quelle heure de la journée la température descend-elle la plus vite ?
- **6.** Quelle est la plus grande valeur possible de f(H+1) f(H) lorsque H est compris entre 0 et 23 ?





Résolution graphique d'équations et inéquations

Équation ou inéquation	f(H) = 12	$f(H) = 12 \qquad \qquad f(H) = 5 \qquad \qquad f$		$f(H) \le 10$
Solutions	1,5 et 9,5	Bao de Solution	Tous les nambres compris entre 11 et 23 (inclus)	Tous le nombre entre 4,5 et 9
Ensemble des solutions, noté S	S={1,5;9,5}	S= \$	S=[~1,23]	S=[4,5; 9]

Rappels sur les ensembles finis (exemples)

L'ensemble qui ne contient aucun élément est appelé ensemble vide : on le note Ø.

L'ensemble dont le seul élément est 1 est noté {1}.

L'ensemble dont les éléments sont 2 et 4 et 6 est noté {2 ; 4} ou bien {4 ; 2}. Etc.

Exercice de la fonction définie par une courbe


G est une grandeur qui dépend du temps t. Voici ci-contre la courbe de la fonction f:


Compléter les phrases suivantes, ainsi que les tableaux.


L'image de 3 par f est . Q . Le nombre . $\overrightarrow{\mathcal{I}}$. est un antécédent de 1 par f .

Le minimum de f est \therefore \mathcal{L} . Ce minimum est atteint en \mathcal{L} ...

L'ensemble des solutions de l'équation f(t) = 0 est 3. et 6....








Exercice du jeu en ligne

Un site de jeux vidéo sur internet constate que la durée de chargement des jeux vidéo dépend du nombre de joueurs connectés en même temps. Le tableau ci-dessous représente les valeurs recueillies par le site :

Nombre de joueurs	50	105	240	400	510	605
Durée de chargement (centième de seconde)	31	38	65	124	192	281

Quel est le temps d'attente lorsque 300 joueurs sont connectés ? Lorsque 700 joueurs sont connectés ?



Exercice du croisement

Au volant de sa voiture, Damien quitte Dijon en direction de Mâcon en empruntant l'autoroute.

Au même moment, \mathbf{M} erouane quitte \mathbf{M} âcon en direction de Dijon à l'autre bout de cette même autoroute.

La distance entre le sud de Dijon et le nord de Mâcon par cette autoroute est de 107 km.

Le trajet est dessiné ci-contre.

Damien roule à la vitesse constante de 90 km/h.

Merouane roule à la vitesse constante de 120 km/h.


Quand et où les deux automobilistes vont-ils se croiser ?



em mim	Damien	Herowane			
0	0	107			
10 mim	15	89			
30 min	45	นจ			
40 mien	60	27			
om a tracé	dans um g	snaphique P	a distance	Damiem -	Dijon et

Pa distance Marowan - Dijon. On obtient deusc ahoites qui se


croisent a envisor 30 minutes et une distance de 45 Rm envisor



Exercice de la distance de sécurité


La prévention routière prévoit une campagne d'information à la suite de l'augmentation du nombre de décès sur les routes. Le but est de rappeler l'importance des distances de sécurité. La distance de sécurité dépend de la vitesse à laquelle on conduit. On l'exprime à l'aide de la fonction $f(v) = 0.003v^3 + 0.2v + 8$ où v est en km/h et f(v) en mètres.

- **1.** Calculer f(50) et **interpréter** ce résultat.
- 2. Quelle est la distance de sécurité si la vitesse du véhicule est de 110 km/h?
- **3.** À l'aide d'une calculatrice graphique, tracer la courbe de cette fonction sur [0; 130].
- 4. À l'aide d'une calculatrice graphique, déterminer la vitesse à ne pas dépasser si on suit une voiture à 70 mètres.
- **5.** Sachant que sur l'autoroute un trait correspond à 38 m et qu'entre deux traits la distance est de 14 m, la phrase de sensibilisation « 1 trait danger, 2 traits sécurité » est-elle pertinente pour une voiture roulant à 130 km/h ?





Exercice de l'avion


Un avion décolle et prend de l'altitude pendant 1,5 minute, il poursuit son trajet à cette altitude pendant 10 minutes et redescend pendant 2 minutes (voir schéma). La vitesse de l'avion reste constante à 480 km/h.



En supposant que le Soleil soit au zénith et que ses rayons soient perpendiculaires au sol, calcule la distance parcourue par son ombre sur le sol.








Exercice du cercle trigonométrique (GeoGebra)

Dans un repère orthonormé, on appelle cercle trigonométrique le cercle de centre O(0;0) et de rayon 1.

M est un point quelconque sur le cercle trigonométrique.

Sur le fichier GeoGebra, à l'aide du curseur, en faisant varier l'angle \widehat{AOM} noté θ , le point M se déplace sur le cercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (appelé sens « direct » par les mathématiciens).



1. Faire varier le curseur entre 0° entre 90° avec un pas de 15°. Recopier et compléter le tableau suivant en arrondissant les coordonnées à 10^{-2} .

Angle OAM	0°	15°	30°	45°	60°	75°	90°
$x_{\rm M}$ (abscise de M)	1	0,97	0,87	0,71	0,5	0,26	0
y _M (ordonnée de M)	0	0,26	0,5	0,71	0,87	0,93	1

2. En se raisonnant dans le triangle OPM rectangle en P, justifier que lorsque l'angle est compris entre 0° et 90°, alors $x_{\rm M} = cos(\widehat{\rm AOM})$ et $y_{\rm M} = sin(\widehat{\rm AOM})$. On rappelle que ${\rm OM} = 1$.

coo.(O) = od = op = op = on (o) = op oc H

 $Sim (o) = \frac{dh}{dy}$ $= \frac{dh}{oH} = \frac{gH}{dm} Sim (o) = gH$

- 3. Au collège, l'étude du sinus et du cosinus s'est limitée aux angles compris entre 0 et 90° (dans un triangle rectangle). En posant $\cos(\theta) = x_{\rm M}$ et $\sin(\theta) = y_{\rm M}$, on peut définir le cosinus et le sinus pour des angles supérieurs à 90°.
- **a.** Modifier les paramètres du curseur pour pouvoir continuer le parcours du point M sur le cercle en faisant varier l'angle 0 entre 90° et 180° avec un pas de 15°. Réaliser un tableau comme précédemment de 90° à 180° avec un pas de 15°.

Angle $ heta$	90°	105	120	135	150	165	180°
$\cos(\theta)$	0	-0,26	-0,5	-0,71	-0,87	-0,97	-1
$\sin(\theta)$	1	0,97	0,87	0,31	0,5	0,26	0

b. Comparer ce tableau à celui de la question 1. Quelles remarques peut-on faire ?


4. À l'aide des tableaux précédents, réaliser un nouveau tableau allant de 180° à 270° avec un pas de 15°. Vérifier ensuite les résultats sur GeoGebra.

Angle θ	180	195	210	225	240	255	270
$\cos(\theta)$	-1	-0,97	-0,87	-0,71	-0,5	-0,26	0
$\sin(\theta)$	0	-0,26	-0,5	-0,74	-0,87	-0,97	1

5. Réaliser de même un tableau allant de 270° à 360° avec un pas de 15°.

Angle $ heta$	270	285	300	315	330	345	360
$\cos(\theta)$	0	0,26	0,5	0,21	0,89	0,97	1
$\sin(\theta)$	-1	-0,97	-0,87	0,91	-0,5	-0,26	6

* étape 2: cos et simus d'angles entre 0° et 360° -> Voir l'exercice du cercle trigomométrique (Géolie Cia) A BETENIA Le cercle trigonometrique est le cercle de centre 0 (l'origine du refere) et de rayon 1. Si it est un point de ce cercle, ces coordonnées donnent le cosimus de l'ample OITI (qui on mote or dans la suite) abociose de 4 xx cos(x) ordonnée de 11 y n son (a



Placer B tel que IOB = 100° Places C tel que IOB = 160° et D tel que IOBD = 340° · Re point D tel que IOD = 340° domme cos (340°) = 0,94 Sim (3400) = -0, 34 · le point E tel que IOE = 200° domme cos (200°) = -0,94 sim (2000) = -0,04 Remarque: on peut exploiter les symétrie entre ces point pour deviner les valeur de cos et sin. ler : C'est le symétrique de A par rapport a l'acre des ordonnée donc oc = - oca et ge = ya) On peut utiliser la même logique pour complèter le tableau des valeur remarquable 0° 30° 45° 60° 30° 120° 135° 150° 1 \frac{\sqrt{3}}{2} \frac{\sqrt{2}}{2} \frac{1}{2} \quad 0 \quad \frac{-1}{2} \quad \frac{-\sqrt{2}}{2}

Chou ette mais pas matique avec les degnés. L'heureusement les nadians vant nous sauver la mise mais an en parte dans 2 semaines

Exercice du fournisseur d'électricité

L'entreprise GreenWatt fournit de l'électricité décarbonée pour les particuliers (maisons ou appartements) et les entreprises (bureaux, commerces, etc). Les clients doivent choisir parmi trois tarifs :

Tarif A: 20 centimes par kWh consommé


• Tarif B : 17 centimes par kWh consommé, auxquels s'ajoute un forfait mensuel fixe de 20 €

• Tarif C : 12,5 centimes par kWh consommé, auxquels s'ajoute un forfait mensuel fixe de 130 €

1. Pour un logement de 75 m², la consommation mensuelle moyenne est estimée entre 800 et 1200 kWh. Quel est le tarif le plus avantageux pour un tel logement ?

2. Pour quelle consommation le tarif A est-il le plus avantageux ?

3. Déterminer le tarif le plus avantageux en fonction de la quantité d'électricité consommée.



Bour les question 2 et 3 on commidère les fonctions a, b et c modélisant les taufs A, B et C en fonction de x la compo en Rub

$$a(x) = 0.2 x$$

 $b(x) = 0.19 x + 20$
 $c(x) = 0.125 x + 130$